

Pak Choi

Anzuchtkarte

SORTE AUSSAATDATUM



1 Aussaat und Keimphase

Einen Samen in die Mulde des feuchten Anzuchtwürfels legen, mit der Sprühflasche befeuchten und den Deckel auf die Anzuchtbox setzen. Den Samen nicht in den Würfel drücken und nicht einzeln abdecken. In der Keimphase nur Wasser verwenden.

KEIMTEMPERATUR 18-22 °C KEIMDAUER meist 4-7 Tage DÜNGER 0 ml/L

2 Anzucht nach dem Auflaufen

Nach dem Auflaufen hell stellen und regelmäßig lüften. In der Anzuchtbox steht das Wasser etwa auf einem Drittel. In der Station berührt der Würfel zuerst etwa 0,5 cm Wasser; später bleiben 0,5-1 cm Luftspalt.

WASSERWECHSEL 1x pro Woche PH-ZIEL 5,8 LUFTSPALT 0,5-1 cm

3 Frankies Flüssigdünger

Je Liter Wasser. Die fertig gemischte Nährlösung immer mit dem EC-Messgerät kontrollieren.

KEIMUNG 0 ml NACH KEIMUNG 0,5 ml ERSTE BLÄTTER 1 ml WACHSTUM 2 ml GROSS / ERNTE 3 ml

4 HydroTower

PH-ZIEL 5,8 EC WACHSTUM 1,4-1,8 NÄHRLÖSUNG nachfüllen

5 Pumpe und Bewässerungszeit

Die Pumpe muss an jeder belegten Öffnung zuverlässig Wasser liefern. Bei warmer Nährlösung sorgt ein Luftsprudler zusätzlich für Sauerstoff an den Wurzeln.

AUSSEN NORMAL 5-7 min. / 30 aus EXTREME HITZE 7 min. / 15 aus INNEN 5 min. / 30 aus

6 Indoor-Licht und Klima

Licht auf Blatthöhe messen. Ein kleiner Ventilator bewegt die Blätter nur sanft. Regelmäßig lüften, damit sich keine dauerhaft feuchte Luft zwischen den Blättern staut.

JUNGPFLANZEN 100-150 PPFD WACHSTUM 175-225 PPFD LICHTDAUER 14-16 Std.

7 Messprotokoll und Notizen

DATUM	pH	EC	ÄNDERUNG / NOTIZ